

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка №: 11040019 Назва сорту Бостіна F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

21.03.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130085

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти: Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	вузький	3
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галузнення (другої і третьої китиці)	багато	3
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	дуже великий	9
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	крутляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	м'яке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже маленький	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	великий	7
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	ознака не визначалась	0
38	Плід: колір за досягання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до <i>Verticillium dahliae</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0

50.3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи В	ознака не визначалась	0
50.4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи С	ознака не визначалась	0
50.5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50.6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи Е	ознака не визначалась	0
51.1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51.2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51.3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51.4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1 - 2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна урожайність – 140 т/га; маса товарного плоду - 230 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 54днів; період плодоношення - 150 днів; вміст сухої речовини в плоді – 3%; вміст загального цукру – 3,2 %; вміст вітаміну С – 35 мг%; вміст каротину – 33мг%; загальна кислотність – 0,4%. Пошкодження шкідниками: попелицею – 6 %. Ураженість хворобами: фітофторозом – 8%, макроспоріоз – 8%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Закритий ґрунт