

Вид: Редька посівна *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

Заявка №: 09039002 Назва сорту Уманська біла зимова

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.11.2013 Патент №: 130221

Дата пріоритету 10.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.07.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130441

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоідність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім'ядолі: за розміром	малі	3
4	Листкова розетка: за шириною зростання при основі	середня	5
5	Листок: положення у просторі	напіввисхідне	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня кількість	5
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опущення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
17	Коренеплід: за товщиною	товстий	7
18	Коренеплід: товщина головного кореня	середній	5
19	Коренеплід: за формою	оберненояйцеподібний	4
20	Коренеплід: форма верхівки	увігнута	1
21	Коренеплід: форма основи	вузькозагострена	1
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	біле	1
24	Коренеплід: прояв червоного кольору у верхній частині	ознака не визначалась	0
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначалась	0
26	Коренеплід: товщина кори	середня	5
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	магове біле	2
28	Час достигання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 36,7 ц/га; Середня маса коренеплоду 237 ц/га; гниллю – 1,1%.

до достигання 100 діб. Ураженість хворобами: мокрою

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся