

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

**Заявка №:** 10038002 **Назва сорту** Каспар F1

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №:**

**Дата пріоритету**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

21.03.2013

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 130087

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодюність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім'ядолі: за розміром	малі	3
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	горизонтальне	5
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	сіруватий	3
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мало	3
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	помірні	5
14	Листкова пластинка: опущення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
17	Коренеплід: за товщиною, см	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	тонкий	3
19	Коренеплід: за формою	округлий	2
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	яскраво-червоний (кольору кіноварі)	1
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1
28	Час досягання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність 225 т/га; Середня маса плоду 35 г; Тривалість періоду до досягання 55 діб; Вміст сухої речовини 8 %; Вміст вітаміну С 12мг%. Ураженість хворобами: мокрою гниллю – 10%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Закритий ґрунт