

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

Заявка №: 09038001 **Назва сорту** Ровер F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130150

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плодюність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотіля	наявне	9
3	Сім'ядолі: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	горизонтальне	5
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мало	3
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	помірні	5
14	Листкова пластинка: опущення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
17	Коренеплід: за товщиною, см	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	тонкий	3
19	Коренеплід: за формою	округлий	2
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	тупа	3
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	яскраво-червоний (кольору кіноварі)	1
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	середня	5
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	дуже ранній	1
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність 27 т/га, середня маса плоду 18 г, тривалість періоду до досягання 25 діб, вміст сухої речовини 5,6%, вміст вітаміну С 36 мг%. (Інформація надана заявником)

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся