

Вид: Цибуля городня Allium sera L.

Заявка №: 09041025 Назва сорту Елоді

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 05.11.2013 Патент №: 130245

Дата пріоритету 25.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

22.03.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130167

### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	помірна	2
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	довгий	7
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	довге	7
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутнє або дуже слабе	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	середня	5
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулінка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/цибулінка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулінка: товщина сухої шкірки	тонка	3
23	Цибулина/цибулінка: основний колір сухої шкірки	білий	1
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	ознака не визначається	0
25	Цибулина/цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки	сіруватий	2
26	Цибулина/цибулінка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
27	Цибулина/цибулінка: кількість точок зростання на кг	середня кількість	5
28	Цибулина/цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	ранній	3
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1

#### За інформацією наданою заявником:

##### - показники господарської придатності

Загальна врожайність 45 т/га, тривалість вегетації 290 діб. Вміст вітаміну С 9 мг%, сухої речовини в цибуліні 15%, загального цукру 9,5%.

#### Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся