

Вид: Рис посівний *Oryza sativa* L.

Заявка № 16017003 Назва сорту: Пашали Заявник (код): 2246 Власник сорту (код): 2246

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190434

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення                 | Код | Примітка |
|----|---|----------------------------|-----|----------|
| 1  | Колеоптиль: антоціанове забарвлення   | відсутнє або дуже слабке   | 1   |          |
| 2  | Основний листок: забарвлення піхви  | зелене                     | 1   |          |
| 3  | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення  | помірна                    | 5   |          |
| 4  | Листок: антоціанове забарвлення   | відсутнє                   | 1   |          |
| 5  | Листок: поширення антоціанового забарвлення   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 6  | Листкова піхва: антоціанове забарвлення   | відсутнє                   | 1   |          |
| 7  | Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення                             | ознака не визначається     | 0   |          |
| 8  | Листок: опушення поверхні пластинки   | слабке                     | 3   |          |
| 9  | Листок: антоціанове забарвлення вушок   | відсутнє                   | 1   |          |
| 10 | Листок: антоціанове забарвлення шийки   | відсутнє                   | 1   |          |
| 11 | Листок: форма язичка  | подвійна                   | 3   |          |
| 12 | Листок: забарвлення язичка  | безбарвний                 | 1   |          |
| 13 | Листкова пластинка: за довжиною   | середня                    | 5   |          |
| 14 | Листкова пластинка: за шириною  | широка                     | 7   |          |
| 15 | Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)                          | пряме                      | 1   |          |
| 16 | Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)                          | напівпряме                 | 3   |          |
| 17 | Рослина: габітус  | прямий                     | 1   |          |
| 18 | Тільки для сланких сортів. Стебло: здатність утворювати коліно                      | ознака не визначається     | 0   |          |
| 19 | Час появи волоті (50% рослин з волотями)  | пізній                     | 7   |          |
| 20 | Чоловіча стерильність   | відсутня                   | 1   |          |
| 21 | Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля (раннє обстеження)               | відсутнє або дуже слабке   | 1   |          |
| 22 | Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (раннє обстеження) | відсутнє або дуже слабке   | 1   |          |
| 23 | Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (раннє обстеження)           | відсутнє або дуже слабке   | 1   |          |
| 24 | Колосок: забарвлення прийомки   | біле                       | 1   |          |
| 25 | Стебло: за товщиною   | середнє                    | 5   |          |
| 26 | Лише несланкі сорти. Стебло: за довжиною (включно волоть)                           | середнє                    | 5   |          |
| 27 | Стебло: антоціанове забарвлення вузлів  | відсутнє                   | 1   |          |
| 28 | Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів                              | ознака не визначається     | 0   |          |
| 29 | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів   | відсутнє                   | 1   |          |
| 30 | Волоть: головна вісь за довжиною  | середня                    | 5   |          |
| 31 | Волоть: кількість на рослині  | мала                       | 3   |          |
| 32 | Волоть: остюки  | відсутні                   | 1   |          |
| 33 | Волоть: забарвлення остюків (раннє обстеження)                                      | ознака не визначається     | 0   |          |
| 34 | Волоть: розташування остюків  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 35 | Волоть: найдовші остюки за довжиною   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 36 | Колосок: опушення нижньої квіткової луски   | помірне                    | 5   |          |
| 37 | Колосок: забарвлення верхівки нижньої квіткової луски                               | жовтувате                  | 2   |          |
| 38 | Волоть: забарвлення остюків (пізнє обстеження)                                      | ознака не визначається     | 0   |          |
| 39 | Волоть: положення відносно стебла   | слабко похилене            | 3   |          |
| 40 | Волоть: вторинне гілкування   | відсутнє                   | 1   |          |
| 41 | Волоть: тип вторинного гілкування   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 42 | Волоть: положення гілок   | напівпряме                 | 3   |          |
| 43 | Волоть: повнота виявлення (розгортання)   | помірна                    | 5   |          |
| 44 | Час досягання   | пізній                     | 7   |          |
| 45 | Листок: час старіння (пожовтіння)   | середній                   | 5   |          |
| 46 | Нижня квіткова луска: забарвлення   | золотисте                  | 2   |          |
| 47 | Нижня колоскова луска: орнаментация   | відсутня                   | 1   |          |
| 48 | Нижня колоскова луска: антоціанове забарвлення кіля (пізнє обстеження)              | відсутнє або дуже слабке   | 1   |          |
| 49 | Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (пізнє обстеження) | відсутнє або дуже слабке   | 1   |          |
| 50 | Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (пізнє обстеження)           | відсутнє або дуже слабке   | 1   |          |
| 51 | Колоскова луска: за довжиною  | коротка                    | 3   |          |
| 52 | Колоскова луска: забарвлення  | солом'яне                  | 1   |          |
| 53 | Зернівки: маса 1000 шт.   | середня                    | 5   |          |
| 54 | Зернівка: за довжиною   | середня                    | 5   |          |
| 55 | Зернівка: за шириною  | широка                     | 7   |          |
| 56 | Нижня квіткова луска: реакція на фенол  | відсутня                   | 1   |          |
| 57 | Нижня квіткова луска: інтенсивність фенольної реакції (забарвлення)                 | ознака не визначалася      | 0   |          |
| 58 | Обрушена зернівка: за довжиною  | середня                    | 5   |          |
| 59 | Обрушена зернівка: за шириною   | широка                     | 7   |          |
| 60 | Обрушена зернівка: форма (вигляд збоку)   | напівверетеноподібна       | 3   |          |
| 61 | Обрушена зернівка: забарвлення  | біле                       | 1   |          |
| 62 | Ендосперм: тип  | неглютиновий               | 3   |          |
| 63 | Ендосперм: за вмістом амілози   | стан 4                     | 4   |          |
| 64 | Лужна дигестія  | повністю дигестує          | 7   |          |
| 65 | Обрушена зернівка: аромат   | відсутній або дуже слабкий | 1   |          |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га – 8. Вегетаційний період, днів – 120. Плівковість, % – 18. Склоподібність, % – 95. Вихід крупи, % – 81. Вихід цілого ядра, % – 71. Група стиглості – середньостиглий. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): пірикуляріоз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**