

Вид: Льон звичайний, довгунець *Linum usitatissimum* L.

Заявка № 17081001 Назва сорту: БІНГО **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.11.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 181021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Пелюстка: забарвлення у фазі пуп'янка	блакитно-фіолетове	3	
2	Час початку цвітіння	середній	5	до раннього
3	Віночок: розташування пелюсток	перекриваються	3	
4	Віночок: забарвлення	блакитно-фіолетове	6	
5	Квітка: розмір віночка	малий	3	до середнього
6	За винятком сортів з білим віночком. Квітка: форма серединки віночка	округла	1	
7	Пелюстка: за довжиною	дуже довга	9	
8	Пелюстка: за шириною	дуже широка	9	
9	Пелюстка: відношення довжина/ширина	дуже велике	9	
10	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки	біле	1	
11	Тичинка: забарвлення базальної частини нитки	біле	1	
12	Пиляк: забарвлення	блакитнувате	4	
13	Маточка: забарвлення	біле з блакитними крапками біля основи	4	
14	Рослина: за висотою	низька	3	
15	Коробочка: розмір	середній	5	до великого
16	Коробочка: в'ячатиість несправжніх перетинок	наявна	9	
17	Коробочка: за довжиною	довга	7	
18	Коробочка: за шириною	середня	5	
19	Коробочка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
20	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до першої гілочки	коротке	3	
21	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до верхівкової коробочки	коротке	3	
22	Насіння: маса 1000 шт	середня	5	до великої
23	Насінина: забарвлення	коричневе	3	
24	Насінина: за довжиною	довга	4	
25	Насінина: за шириною	широка	4	
26	Насінина: відношення довжина/ширина	помірно велике	4	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрямок використання: олійний. Урожайність соломки, т/га – 4,5. Урожайність насіння (за стандартної вологості 12%), т/га – 1,85. Маса 1000 насінин, г – 7,8. Вміст олії в насінні – 40,3%. Вміст в олії: ліноленової кислоти – 52,9%, лінолевої кислоти – 13,6%, олеїнової кислоти – 21,4%. Вміст білка в насінні – 22,5%. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вертицильозне в'янення (вілт) (*Verticillium fahliae* Kleb.) – 5; фузаріозне в'янення (*Fusarium lini* Bolley.) – 6; іржа (*Melampsora lini* Desm.) – 5; пасмо (*Phlyctaena linicola* Garr.) – 5; антракноз (*Colletotrichum lini* Manns et Bolley) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.