

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16040016 Назва сорту:** ІНВ1177 КЛ **Заявник (код):** 1991 **Власник сорту (код):** 1991

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 181064**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Насіння: ерукова кислота                                    | відсутня                 | 1   |          |
| 2  | Сім'ядолі: за довжиною                                      | короткі                  | 3   |          |
| 3  | Сім'ядолі: за шириною                                       | вузькі                   | 3   |          |
| 4  | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                  | помірна                  | 5   |          |
| 5  | Листок: частки  | наявні                   | 9   |          |
| 6  | Листок: кількість часток (повний розвиток листка)           | велика                   | 7   |          |
| 7  | Листок: зубчастість краю                                    | помірна                  | 5   |          |
| 8  | Листок: за довжиною (пластинка і черешок)                   | середній                 | 5   |          |
| 9  | Листок: за шириною (у найширшому місці)                     | вузький                  | 3   |          |
| 10 | Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка | середня                  | 5   |          |
| 11 | Рослина: час початку цвітіння                               | середній                 | 5   |          |
| 12 | Квітка: забарвлення пелюсток                                | жовте                    | 3   |          |
| 13 | Квітка: пелюстки за довжиною                                | середні                  | 5   |          |
| 14 | Квітка: пелюстки за шириною                                 | вузькі                   | 3   |          |
| 15 | Рослина: утворення пилку                                    | наявне                   | 9   |          |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння)                   | висока                   | 7   |          |
| 17 | Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)      | довга                    | 7   |          |
| 18 | Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)           | середній                 | 5   |          |
| 19 | Стручок: носик за довжиною                                  | середній                 | 5   |          |
| 20 | Стручок: плодоніжка за довжиною                             | коротка                  | 3   |          |
| 21 | Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби           | відсутня або дуже слабка | 1   |          |
| 22 | Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби     | ознака не визначається   | 0   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |      |      |
|---|----------|------|------|
|   | С        | Л    | П    |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 19,7     | 32,1 | 24,1 |
| Довірчий інтервал, ц/га (±)   | 0,5      | 0,6  | 0,4  |
| Урожайність, ц/га   | 24,0     | 34,7 | 29,6 |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га  | 4,3      | 2,6  | 5,5  |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, %   | 22,0     | 8,0  | 23,0 |
| Висота рослин, см   | 119      | 110  | 112  |
| Тривалість вегетаційного періоду, днів  | 286      | 318  | 299  |
| Стійкість до вилягання, бал   | 9        | 8    | 9    |
| Стійкість до посухи, бал  | 6        | 7    | 8    |
| Стійкість до обсіпання, бал   | 8        | 7    | 7    |
| Зимостійкість, бал  | 7        | 7    | 7    |
| Стійкість проти пильщика ріпакового, бал  | 8        | 8    | 8    |
| Стійкість проти ріпакового квіткоїду, бал   | 8        | 7    | 6    |
| Стійкість проти бактеріозу, бал   | 8        | 9    | 8    |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал  | 8        | 9    | 6    |
| Вміст білка, %  | 21,3     | 19,4 | 17,7 |
| Вміст олії, %   | 45,3     | 46,9 | 48,9 |
| Вміст глюкозинолатів, %   | 0,8      | 0,8  | 0,8  |
| Вміст ерукової кислоти, %   | 0,0      | 0,5  | 0,0  |
| Напрямок використання   | олн      | олн  | олн  |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Л.