

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 15040040 Назва сорту: ПТ279КЛ Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190441

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Насіння: ерукова кислота                                    | відсутня                 | 1   |          |
| 2  | Сім'ядолі: за довжиною                                      | короткі                  | 3   |          |
| 3  | Сім'ядолі: за шириною                                       | вузькі                   | 3   |          |
| 4  | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                  | помірна                  | 5   |          |
| 5  | Листок: частки  | наявні                   | 9   |          |
| 6  | Листок: кількість часток (повний розвиток листка)           | середня                  | 5   |          |
| 7  | Листок: зубчастість краю                                    | помірна                  | 5   |          |
| 8  | Листок: за довжиною (пластинка і черешок)                   | короткий                 | 3   |          |
| 9  | Листок: за шириною (у найширшому місці)                     | вузький                  | 3   |          |
| 10 | Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка | середня                  | 5   |          |
| 11 | Рослина: час початку цвітіння                               | середній                 | 5   |          |
| 12 | Квітка: забарвлення пелюсток                                | жовте                    | 3   |          |
| 13 | Квітка: пелюстки за довжиною                                | середні                  | 5   |          |
| 14 | Квітка: пелюстки за шириною                                 | середні                  | 5   |          |
| 15 | Рослина: утворення пилку                                    | наявне                   | 9   |          |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння)                   | висока                   | 7   |          |
| 17 | Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)      | довга                    | 7   |          |
| 18 | Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)           | середній                 | 5   |          |
| 19 | Стручок: носик за довжиною                                  | середній                 | 5   |          |
| 20 | Стручок: плодоніжка за довжиною                             | середня                  | 5   |          |
| 21 | Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби           | відсутня або дуже слабка | 1   |          |
| 22 | Тенденція формування суцвіть в рік пізно-літньої сівби      | ознака не визначається   | 0   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |      |      |
|---|----------|------|------|
|   | С        | Л    | П    |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 19,7     | 32,1 | 24,1 |
| Довірчий інтервал, ц/га (±)   | 0,5      | 0,6  | 0,4  |
| Урожайність, ц/га   | 22,5     | 36,2 | 29,1 |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га  | 2,8      | 4,1  | 5,0  |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, %   | 14,0     | 13,0 | 21,0 |
| Висота рослин, см   | 124      | 108  | 122  |
| Тривалість вегетаційного періоду, днів  | 286      | 321  | 299  |
| Стійкість до вилягання, бал   | 9        | 8    | 9    |
| Стійкість до посухи, бал  | 7        | 8    | 8    |
| Стійкість до обсипання, бал   | 8        | 8    | 7    |
| Зимостійкість, бал  | 7        | 8    | 8    |
| Стійкість проти пильщика ріпакового, бал  | 8        | 9    | 8    |
| Стійкість проти ріпакового квіткоїду, бал   | 8        | 8    | 6    |
| Стійкість проти бактеріозу, бал   | 8        | 9    | 8    |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал  | 8        | 9    | 7    |
| Вміст білка, %  | 21,4     | 18,2 | 17,9 |
| Вміст олії, %   | 45,5     | 48,4 | 48,9 |
| Вміст глюканолатів, %   | 0,9      | 0,7  | 0,7  |
| Вміст ерукової кислоти, %   | 0,1      | 0,1  | 0,0  |
| Напрямок використання   | олн      | олн  | олн  |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**