

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 15041005 Назва сорту: 44И84 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190447

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Насіння: ерукова кислота | відсутня | 1 | |
| 2 | Сім'ядоля: за довжиною | середня | 5 | |
| 3 | Сім'ядоля: за шириною | широка | 7 | |
| 4 | Листок: інтенсивність зеленого кольору | помірний | 5 | |
| 5 | Листок: наявність часток | наявні | 9 | |
| 6 | Листок: кількість часток (повний розвиток листка) | мало | 3 | |
| 7 | Листок: зубчастість краю | помірна | 5 | |
| 8 | Листок: за довжиною (пластинка і черешок) | короткий | 3 | |
| 9 | Листок: за шириною (у найширшому місці) | вузький | 3 | |
| 10 | Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка | короткий | 3 | |
| 11 | Рослина: час цвітіння | середній | 5 | |
| 12 | Квітка: колір пелюсток | жовтий | 3 | |
| 13 | Квітка: довжина пелюсток | короткі | 3 | |
| 14 | Квітка: ширина пелюсток | середні | 5 | |
| 15 | Рослина: утворення пилку | наявне | 9 | |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння) | середня | 5 | |
| 17 | Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно) | середня | 5 | |
| 18 | Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем) | середній | 5 | |
| 19 | Стручок: довжина зубця | середній | 5 | |
| 20 | Стручок: довжина ніжки | середня | 5 | |
| 21 | Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби | ознака не визначається | 0 | |
| 22 | Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби | відсутня або дуже слабка | 1 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|------|------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | - | 20,2 | 17,8 |
| Довірчий інтервал, ц/га (±) | - | 0,9 | 0,8 |
| Урожайність, ц/га | - | 19,6 | 16,4 |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га | - | -0,6 | -1,4 |
| ± до усередненого значення за 5 попередніх років, % | - | -3,0 | -7,9 |
| Маса 1000 насінин, г | - | 4 | 4 |
| Висота рослин, см | - | 110 | 105 |
| Тривалість вегетаційного періоду, днів | - | 97 | 104 |
| Стійкість до вилягання, бал | - | 9 | 8 |
| Стійкість до посухи, бал | - | 8 | 8 |
| Стійкість до обсіпання, бал | - | 8 | 6 |
| Стійкість проти пильщика ріпакового, бал | - | 8 | 8 |
| Стійкість проти ріпакового квіткоїду, бал | - | 8 | 7 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | - | 9 | 8 |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал | - | 9 | 7 |
| Вміст білка, % | - | 25,2 | 25,9 |
| Вміст олії, % | - | 41,8 | 43,0 |
| Вміст глюканолатів, % | - | 0,7 | 0,7 |
| Вміст ерукової кислоти, % | - | 0,0 | 0,0 |
| Напрямок використання | - | олн | олн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.