

Вид: Сорго звичайне двокольорове
Sorghum bicolor (L.) Moench

ОПИС СОРТУ РОСЛИН.

Назва сорту: Квебек

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110408

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|----------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля | сильне | 7 |
| 2 | Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 3 | Паросток: антоціанове забарвлення пазухи першого листка | помірне | 5 |
| 4 | Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 5 | Рослина: час викидання волоті (50% рослин з волоттю) | дуже ранній | 1 |
| 6 | Рослина: за висотою під час викидання волоті | низька | 3 |
| 7 | Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті) | темне | 7 |
| 8 | Прапорцевий листок: поширення обезбарвлення середньої жилки (за викидання волоті) | слабке | 3 |
| 9 | Прапорцевий листок: інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не обезбарвлена, викидання волоті) | світліше | 1 |
| 10 | Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (за викидання волоті) | помірне | 5 |
| 11 | Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння | світло-зелене | 2 |
| 12 | Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 13 | Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (під час цвітіння) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 14 | Нижня квіткова луска: розвиток устяка (під час цвітіння) | відсутній або дуже слабкий | 1 |
| 15 | Приймочка: антоціанове забарвлення (під час цвітіння) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 16 | Приймочка: жовте забарвлення (під час цвітіння) | сильне | 7 |
| 17 | Приймочка: за довжиною (як для 12) | середня | 5 |
| 18 | Квітка з квітконіжкою: за довжиною квітки (під час цвітіння) | середня | 5 |
| 19 | Волоть: щільність в кінці цвітіння | щільна | 7 |
| 20 | Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння) | червоне | 5 |
| 21 | Рослина: за висотою (за досягання) | низька | 3 |
| 22 | Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання) | тонке | 3 |
| 23 | Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (за досягання) | короткий | 3 |
| 24 | Листок: за шириною пластинки (за досягання) | вузкий | 3 |
| 25 | Волоть: за довжиною без шийки (за досягання) | середня | 5 |
| 26 | Волоть: довжина гілочок (всередній третині волоті) | короткі | 3 |
| 27 | Волоть: щільність (за досягання) | помірна | 5 |
| 28 | Волоть: форма (за досягання) | симетрична | 3 |
| 29 | Шийка волоті: видима довжина над пазухою (обгорткою, за досягання) | коротка | 3 |
| 30 | Колоскова луска: забарвлення за досягання | жовте | 3 |

| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| 31 | Колоскова луска: за довжиною (за досягання) | довга | 7 |
| 32 | Зернівка: забарвлення після досягання | червоно-коричневе | 8 |
| 33 | Маса 1000 зерен | середня | 5 |
| 34 | Зернівка: форма зі спинки | еліптична | 5 |
| 35 | Зернівка: форма в профіль | вузькоеліптична | 3 |
| 36 | Зернівка: розмір зародка | великий | 7 |
| 37 | Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою | велика | 7 |
| 38 | Зернівка: вміст таніну | ознака не визначалась | 0 |
| 39 | Зерно: структура ендосперму (в подовжному розрізі) | на 1/2 склоподібна | 5 |
| 40 | Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму | жовте | 3 |