

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08024020

Вид: Горох овочевий

Pisum sativum L. partim

Назва сорту: Бутана

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 08.02.2011 Патент № 110010

Дата пріоритету: 08.12.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.02.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110060

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|------------------------|-----|
| 1 | Насінина: форма | циліндрична | 3 |
| 2 | Насінина: форма крохмального зерна | складна | 2 |
| 3 | Насінина: забарвлення сім'ядолей | зелене | 1 |
| 4 | Тільки сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної оболонки | ознака не визначається | 0 |
| 5 | Тільки сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові або рожеві плями на насінній оболонці | ознака не визначається | 0 |
| 6 | Насінина: чорне забарвлення рубчика (шва) | відсутній | 1 |
| 7 | Тільки сорти з антоціаном. Насінина: колір оболонки | ознака не визначається | 0 |
| 8 | Тільки сорти з гладеньким насінням і простими крохмальними зернами. Насінина: ямкуватість сім'ядолі | ознака не визначається | 0 |
| 9 | Рослина: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 10 | Рослина: за висотою | висока | 7 |
| 11 | Стебло: фасціація | відсутня | 1 |
| 12 | Стебло: за довжиною | довге | 7 |
| 13 | Стебло: кількість вузлів, перший фертильний вузол включно | дуже багато | 9 |
| 14 | Тільки сорти з антоціаном. Стебло: антоціанове забарвлення пазухи (листка) | ознака не визначається | 0 |
| 15 | Тільки сорти з антоціаном. Стебло: тип антоціанового забарвлення пазухи (листка) | ознака не визначається | 0 |
| 16 | Листок: забарвлення | зелене | 2 |
| 17 | Листки: інтенсивність забарвлення (за винятком жовто-зелених та зелено-блакитних сортів) | помірна | 5 |
| 18 | Листки: сіруватий відтінок | наявний | 9 |
| 19 | Листок: (вторинні листочки) | відсутні | 1 |
| 20 | Листок: восковий наліт на верхніх вторинних листочках | ознака не визначається | 0 |
| 21 | Листок: середнє з максимальної кількості вторинних листочків | ознака не визначається | 0 |
| 22 | Вторинний листочок: розмір | ознака не визначається | 0 |
| 23 | Вторинний листочок: за довжиною | ознака не визначається | 0 |
| 24 | Вторинний листочок: за шириною | ознака не визначається | 0 |
| 25 | Вторинний листочок: відстань від найширшої частини до основи | ознака не визначається | 0 |
| 26 | Вторинний листочок: зубчастість | ознака не визначається | 0 |
| 27 | вторинний листочок: стулінь зубчастості | ознака не визначається | 0 |
| 28 | Прилисток: тип розвитку | добре розвинутий | 2 |
| 29 | Прилисток: форма "кролячі вуха" | відсутня | 1 |
| 30 | Прилисток: восковий наліт на поверхні | наявний | 9 |
| 31 | Прилисток: за довжиною | довгий | 7 |
| 32 | Прилисток: за шириною | широкий | 7 |
| 33 | Прилисток: плямистість | наявна | 9 |
| 34 | Прилисток: щільність плямистості | помірна | 5 |

Заявка №: 08024020

Вид: Горох овочевий

Pisum sativum L. partim

Назва сорту: Бутана

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 03.02.2011 Пате нт №: 110010

Дата пріоритету: 08.12.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 03.02.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 11 0060

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|------------------------|-----|
| 35 | Тільки сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною (від пазухи до першого вусика) | середній | 5 |
| 36 | Рослина: час цвітіння | середній | 5 |
| 37 | Тільки нефасційовані (немутовчасті) сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі | від двох дотрьох | 4 |
| 38 | Тільки сорти з антоціаном. Квітка: антоціанове забарвлення крил (весел) | ознака не визначається | 0 |
| 39 | Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками. Квітка: інтенсивність червонувато-пурпурового забарвлення крил (весел) | ознака не визначається | 0 |
| 40 | Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками. Квітка: інтенсивність забарвлення паруса | ознака не визначається | 0 |
| 41 | Тільки сорти без антоціану. Квітка: колір паруса | білий | 1 |
| 42 | Квітка: максимальна ширина паруса | середня | 5 |
| 43 | Квітка: форма основи паруса | пряма | 5 |
| 44 | Квітка: інтенсивність хвилястості паруса | слабка | 3 |
| 45 | Квітка: ширина чашолистика | середня | 5 |
| 46 | Квітка: форма верхівки верхнього чашолистика (на другому квітучому вузлі) | загострена | 2 |
| 47 | Квітка: довжина квітноїжки від стебла до першої квітки | велика | 7 |
| 48 | Біб: за довжиною | середній | 5 |
| 49 | Біб: за максимальною шириною | середній | 5 |
| 50 | Біб: пергаментність | наяна | 3 |
| 51 | Тільки сорти без пергаментності або з частковою пергаментністю. Біб: потовщення стулок | ознака не визначається | 0 |
| 52 | Біб: ступінь вигину | середній | 5 |
| 53 | Біб: тип вигину | випуклий | 2 |
| 54 | Тільки сорти без потовщеної стулки боба. Біб: форма зовнішньої частини верхівки (периферичної) | ознака не визначається | 0 |
| 55 | Біб: колір | зелений | 2 |
| 56 | Біб: інтенсивність зеленого кольору | помірна | 5 |
| 57 | Тільки сорти без пергаментності або з частковою пергаментністю. Біб: волокна (або жилки) шва | ознака не визначається | 0 |
| 58 | Тільки сорти з антоціаном. Біб: антоціанове забарвлення шва | ознака не визначається | 0 |
| 59 | Тільки сорти з антоціаном. Біб: плями антоціанового забарвлення на зовнішній стінці стулки | ознака не визначається | 0 |
| 60 | Біб: кількість насінних зачатків | середня | 5 |
| 61 | Біб: інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин | помірна | 5 |
| 62 | Насінина: час досягання | середній | 5 |
| 63 | Насінина: зморшкуватість сім'ядолей | наяна | 9 |
| 64 | Насінина: ступінь зморшкуватості сім'ядолей | помірна | 5 |
| 65 | Насінина: маса 1000 насінин | середня | 5 |