

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08025004
Вид: Диня посівна (звичайна)
Melo sativus Sager. ex M. Roem
Назва сорту: Волпер

Заявка №: 08025004

Вид: Диня посівна (звичайна)

Melo sativus Sager. ex M. Roem

Назва сорту: Волпер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 15.03.2011 Патент №: 110222

Дата пріоритету: 20.11.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 101212

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | Паросток: довжина гілочки (фаза першого справжнього листка) | середній | 5 |
| 2 | Паросток: розмір сім'ядоль (фаза першого справжнього листка), см | дуже великий (>3) | 9 |
| 3 | Паросток: інтенсивність зеленого кольору (фаза першого справжнього листка) | сильна | 7 |
| 4 | Рослина: кількість вузлів на основному стеблі (включно до першого вусика) | багато | 7 |
| 5 | Листкова пластинка: за розміром, см | середня (14-18) | 5 |
| 6 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 |
| 7 | Листкова пластинка: вираженість лопатей | помірна | 5 |
| 8 | Листкова пластинка: довжина кінцевої лопаті (центральної) | довга | 7 |
| 9 | Листкова пластинка: зубчастість країв | помірна | 5 |
| 10 | Листкова пластинка: хвилястість країв | помірна | 5 |
| 11 | Листкова пластинка: пухирчастість | слабка | 3 |
| 12 | Черешок: положення (у фазі 3-х листків) | напівпряме | 5 |
| 13 | Черешок: за довжиною, см | короткий (< 12) | 3 |
| 14 | Квітки: за статтю | двостатеві | 2 |
| 15 | Плід: основний колір шкірки перед досяганням | сіро-зелений | 4 |
| 16 | Плід: інтенсивність кольору перед досяганням | помірна | 5 |
| 17 | Плід: за довжиною, см | короткий (10-15) | 3 |
| 18 | Плід: за діаметром | середній | 5 |
| 19 | Плід: відношення довжини до діаметра | мале (1:1,5) | 3 |
| 20 | Плід: місце найбільшої ширини | у центрі | 2 |
| 21 | Плід: форма повздовжнього розрізу | округла | 2 |
| 22 | Плід: основний колір шкірки в період досягання | зелений | 2 |
| 23 | Плід: інтенсивність основного кольору шкірки в період досягання | слабка | 3 |
| 24 | Плід: додаткове забарвлення шкірки (за винятком основного) | відсутнє | 1 |
| 25 | Плід: поширення додаткового забарвлення по шкірці (за винятком основного) | ознака не визначається | 0 |
| 26 | Плід: щільність розміщення цяток | ознака не визначається | 0 |
| 27 | Плід: щільність розміщення плям | ознака не визначається | 0 |
| 28 | Плід: довжина плдоніжки, см | середня (3-7) | 5 |
| 29 | Плід: товщина плдоніжки (на відстані 1 см від плоду) | товста (>0,7) | 7 |
| 30 | Плід: видривання (відпадання) плдоніжки | наявне | 9 |
| 31 | Плід: легкість відривання плдоніжки | помірне | 5 |
| 32 | Плід: форма основи | плеската | 3 |
| 33 | Плід: форма верхівки | плеската | 3 |
| 34 | Плід: розмір рубця маточки, см | великий (>10) | 7 |
| 35 | Плід: смуги | відсутні | 1 |
| 36 | Плід: максимальна ширина між смугами | ознака не визначається | 0 |
| 37 | Плід: ширина смуг | ознака не визначається | 0 |

Заявка №: 08025004

Вид: Диня посівна (звичайна)

Melo sativus Sager.ex M.Roem

Назва сорту: Воллер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 15.03.2011 Патент №: 110222

Дата пріоритету: 20.11.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 101212

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|------------------------|-----|
| 38 | Плід: глибина смуг | ознака не визначається | 0 |
| 39 | Плід: зморшкуватість поверхні | сильна | 7 |
| 40 | Плід: коркове утворення | наявне | 9 |
| 41 | Плід: товщина коркового шару | середній | 5 |
| 42 | Плід: візерунок коркового утворення | сітчастий | 3 |
| 43 | Плід: щільність візерунка коркового утворення | середній | 5 |
| 44 | Плід: колір смуг | ознака не визначається | 0 |
| 45 | Плід: інтенсивність забарвлення смуг | ознака не визначається | 0 |
| 46 | Плід: максимальна ширина м'якуша в поперечному розрізі, см | товстий (>3) | 7 |
| 47 | Плід: максимальна товщина зовнішнього м'якуша в поперечному розрізі, см | середній (0,5-1) | 5 |
| 48 | Плід: основний колір м'якуша | кремовий | 1 |
| 49 | Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якуша | слабка | 3 |
| 50 | Плід: колір м'якуша зовнішнього шару | зелений | 2 |
| 51 | Насінина: за розміром, см | середня (0,9-1,2) | 5 |
| 52 | Насінина: форма кінчика | поступово загострена | 2 |
| 53 | Насінина: форма поперечного розрізу | еліптична | 2 |
| 54 | Насінина: за кольором | кремово-жовта | 2 |
| 55 | Початок цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією жіночою квіткою) | середній | 5 |
| 56 | Початок дозрівання (50 % рослин щонайменше з одним стиглим плодом) | ранній | 3 |