

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08026006

Вид: Кабачок

Cucurbita pepo L.

Назва сорту: Сціплі F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

09.09.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10493

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Рослина: форма сім'ядолей | широко-е ліпн ична | 2 |
| 2 | Рослина: за габітусом | куцова | 1 |
| 3 | Рослина: галуження | наявне | 9 |
| 4 | Рослина: ступінь галуження стебел | від дуже слабкої до слабкої | 2 |
| 5 | Тільки для куцових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків) | напівпряме | 5 |
| 6 | Стебло: зелений колір | лишетьмний | 2 |
| 7 | Стебло: вуши | відсутні або рудиментарні | 1 |
| 8 | Листкова пластинка: за розміром | від середньої до великої | 6 |
| 9 | Листкова пластинка: розсіченість | помірна | 5 |
| 10 | Листкова пластинка: зелений колір верхнього боку | від помірного до темного | 6 |
| 11 | Листкова пластинка: мармуровість | наявна | 9 |
| 12 | Листкова пластинка: поверхня, охоплена мармуровістю | середня | 5 |
| 13 | Черешок: інтенсивність зеленого кольору | помірний | 5 |
| 14 | Черешок: за довжиною | довгий | 7 |
| 15 | Черешок: за товщиною (біля основи) | середній | 5 |
| 16 | Черешок: форма поперечного перерізу | округла | 1 |
| 17 | Черешок: кількість шипів | середня кількість | 5 |
| 18 | Жіноча квітка: кільце в середині віночка | наявне | 9 |
| 19 | Жіноча квітка: колір кільця в середині віночка | зелений | 1 |
| 20 | Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення зеленого кільця в середині віночка | від помірної до сильної | 6 |
| 21 | Жіноча квітка: довжина чашолистків | короткі | 3 |
| 22 | Жіноча квітка: колір маточки (перед відкриттям) | оранжевий | 2 |
| 23 | Чоловіча квітка: вираження кольору кільця в середині віночка | сильний | 7 |
| 24 | Чоловіча квітка: колір кільця в середині основи віночка | зелений | 1 |
| 25 | Чоловіча квітка: довжина квітконіжки | середня | 5 |
| 26 | Чоловіча квітка: діаметр квітконіжки | середній | 5 |
| 27 | Чоловіча квітка: інтенсивність зеленого кольору квітконіжки | темно-зелений | 7 |
| 28 | Чоловіча квітка: рифлення квітконіжки | помірна | 5 |
| 29 | Чоловіча квітка: волосистість квітконіжки | помірна | 5 |
| 30 | Чоловіча квітка: чашолисток за довжиною | короткий | 3 |
| 31 | Молодий плід: за довжиною | середній | 5 |
| 32 | Молодий плід: за найбільшим діаметром | від середнього до великого | 6 |
| 33 | Молодий плід: відношення довжина/найбільший діаметр | середнє | 5 |
| 34 | Молодий плід: шийка | наявна | 9 |
| 35 | Молодий плід: вигин шийки (у нормально розвинених плодів) | відсутній | 1 |
| 36 | Молодий плід: кількість кольорів | один | 1 |
| 37 | Молодий плід: основний колір | зелений | 4 |
| 38 | Молодий плід: інтенсивність основного кольору | від дуже слабкої до слабкої | 2 |

Заявка №: 08026006

Вид: Кабачок

Cucurbita pepo L.

Назва сорту: Сіплі F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.09.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10493

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|-----------------------|-----|
| 39 | Молодий плід: форма поперного перерізу | округла | 1 |
| 40 | Молодий плід: зморшкуватість | відсутня | 1 |
| 41 | Молодий плід: глясуватість | помірна | 5 |
| 42 | Молодий плід: колір ребер у порівнянні з кольором плоду | однаковий | 1 |
| 43 | Молодий плід: колір лінійних смуг на ребрах | ознака не визначалась | 0 |
| 44 | Молодий плід: плямистість | наявна | 9 |
| 45 | Молодий плід: тип плямистості | дифузний та плямистий | 2 |
| 46 | Молодий плід: колір крапчастої поверхні | білуватий | 1 |
| 47 | Молодий плід: вираженість крапчастості шкірки | помірна | 5 |
| 48 | Молодий плід: розмір квіткового рубця | великий | 7 |
| 49 | Молодий плід: виступання квіткового рубця | наявне | 9 |
| 50 | Молодий плід: довжина плодоніжки | середня | 5 |
| 51 | Молодий плід: основний колір плодоніжки | лише зелений | 1 |
| 52 | Молодий плід: інтенсивність основного кольору плодоніжки | помірна | 5 |
| 53 | Молодий плід: плямистість плодоніжки | наявна | 9 |
| 54 | Молодий плід: вираженість плямистості плодоніжки | помірна | 5 |
| 55 | Молодий плід: основна форма | булавоподібна | 8 |
| 56 | Плід: основний колір (за повного природного розміру) | білуватий | 1 |
| 57 | Стиглий плід: основний колір | кремовий | 2 |
| 58 | Плід повністю розвинений за розміром: інтенсивність основного кольору | слабка | 3 |
| 59 | Стиглий плід: інтенсивність основного кольору | слабка | 3 |
| 60 | Плід повністю розвинений за розміром: колір смужок на ребрах | білуватий | 1 |
| 61 | Стиглий плід: колір смужок на ребрах | білуватий | 1 |
| 62 | Повністю розвинений плід за розміром: колір крапчастості шкірки | білуватий | 1 |
| 63 | Стиглий плід: колір шкірки плямистості | білуватий | 1 |
| 64 | Плід: за довжиною | середній | 5 |
| 65 | Плід: за найбільшим діаметром | середній | 5 |
| 66 | Плід: відношення довжина/найбільший діаметр | велике | 7 |
| 67 | Насінина: за розміром | велика | 7 |
| 68 | Насінина: за формою | еліптична | 5 |
| 69 | Насінина: за кольором | білувата | 1 |