

# ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08032013

Вид: Кукурудза цукрова

*Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Назва сорту: Хані Бентем 78

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 10389

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.12.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію №: 091329

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній від 26 до 50	5
4	Листок: положення листової пластинки і стеблом (листок над верхнім качаном)	похиле	5
5	Стебло: степінь зигзагоподібності	відсутня або дуже слабка	1
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, до 50% рослин)	від дуже раннього до раннього	2
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно утворених пиляках)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середнє	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілками (на нижній третині волоті)	середній від 26 до 50	5
13	Волоть: положення бічних пюлок (на нижній третині волоті)	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт	середня від 16 до 25	5
15	Качан: час появи шовку (50% рослин)	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє	1
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення шовку	ознака не визначається	0
18	Листок антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	1
19	Волоть: довжина головної осі (від найнижчої бічної гілочки до верхівки, см)	середня від 31 до 40	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
21	Волоть: довжина бічних гілочок	середні	5
22	Лише для самозайплених ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	0
23	лише для гібридів і сортів вільнозайплених: Рослина: довжина (враховуючи волоть), см	коротка	3
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослин	середнє до 0,6	5
25	Листок: пластинка листка за шириною (листок верхнього качана), см	середня до 10	5
26	Качан: ніжка за довжиною, см	середня від 10,1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середня 11-14	5
28	Качан: діаметр (посередині), см	середній від 3,1 до 4	5
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	середня 14-18	5

Заявка №: 08032013

Вид: Кукурудза цукрова

Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.

Назва сорту: Хан Бентем 78

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №: 10389

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.12.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 091329

№	Озвака	Проявлення	Код
31	Качан: тип зерна (в центральній третині початку)	цукрова кукурудза	6
32	Качан: колір верхньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
33	Качан: колір нижньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
34	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
36	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0
1	Качан: тип зерна (в центральній третині початку)	цукрова кукурудза	6
2	Качан: колір верхньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
3	Качан: колір нижньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
4	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
5	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0
6	Качан: тип зерна (в центральній третині початку)	цукрова кукурудза	6
7	Качан: колір верхньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
8	Качан: колір нижньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
9	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
10	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0
11	Качан: тип зерна (в центральній третині початку)	цукрова кукурудза	6
12	Качан: колір верхньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
13	Качан: колір нижньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
14	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
15	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0
16	Качан: тип зерна (в центральній третині початку)	цукрова кукурудза	6
17	Качан: колір верхньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
18	Качан: колір нижньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
19	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
20	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0
21	Качан: тип зерна (в центральній третині початку)	цукрова кукурудза	6
22	Качан: колір верхньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
23	Качан: колір нижньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
24	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
25	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0
26	Качан: тип зерна (в центральній третині початку)	цукрова кукурудза	6
27	Качан: колір верхньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
28	Качан: колір нижньої частини зерна	жовто-оранжевий	4
29	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє	1
30	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня	ознака не визначається	0