

ОПИС СОРТУ

Заявка №: 09034002

Вид: Морква посівна

Daucus sativus (Hoffm) Roehl.

Назва сорту: Nana F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

28.12.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 101203

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|----------------------------------|-----|
| 1 | Листки: ширина розетки | вузька | 3 |
| 2 | Листок за положенням у просторі | напівпрямий | 5 |
| 3 | Листок: за довжиною (разом із черешком), см | середній (31-40) | 5 |
| 4 | Листок: розсіченість | груба | 7 |
| 5 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 |
| 6 | Листок: антоціанове забарвлення черешка | відсутнє | 1 |
| 7 | Коренеплід: за довжиною, см | довгий (16-20) | 7 |
| 8 | Коренеплід: діаметр, см | середній (3-6) | 5 |
| 9 | Коренеплід: відношення діаметр/довжина | середнє | 5 |
| 10 | Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі | вузькоподовжена | 4 |
| 11 | Коренеплід: форма плеча | плеската | 1 |
| 12 | Коренеплід: місце прикріплення листків | плескате | 5 |
| 13 | Коренеплід: форма кінчика | загострена | 3 |
| 14 | Коренеплід: колір поверхні | оранжевий | 3 |
| 15 | Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні | від помірної до сильної | 6 |
| 16 | Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча | відсутнє | 1 |
| 17 | Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча | відсутній або дуже малий | 1 |
| 18 | Коренеплід: наявність борідок на поверхні | від дуже слабо до слабо виражені | 2 |
| 19 | Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра, % | малий (21-30) | 3 |
| 20 | Коренеплід: забарвлення серцевини | оранжеве | 3 |
| 21 | Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини | сильна | 7 |
| 22 | Коренеплід забарвлення флоєми (м"якуша) | оранжеве | 3 |
| 23 | Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми | сильна | 7 |
| 24 | Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням м"якуша | однакова | 2 |
| 25 | Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 26 | Коренеплід: надземна частина | відсутня або дуже мала | 1 |
| 27 | Коренеплід: маса | мала | 3 |
| 28 | Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки | ознака не визначається | 0 |
| 29 | Коренеплід: час забарвлення верхівки | середній | 5 |
| 30 | Коренеплід: час досягання | середній | 5 |
| 31 | Коренеплід: вміст каротину | середній | 5 |
| 32 | Коренеплід: загальний вміст цукру | високий | 7 |
| 33 | Коренеплід: відносний вміст моноцукрів до загального вмісту цукру | високий | 7 |
| 34 | Коренеплід вміст сухої речовини | середній | 5 |
| 35 | Рослина: тенденція до стрілкування | ознака не визначається | 0 |
| 36 | Рослина: за висотою під час цвітіння (розкрито перший зонтик) | ознака не визначається | 0 |
| 37 | Рослина: відносна кількість рослин з чоловічою стерильністю | ознака не визначається | 0 |
| 38 | Рослина: тип чоловічої стерильності | ознака не визначається | 0 |