

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039025 Назва сорту: НС ХДФСП **Заявник (код):** 1978 1210 **Власник сорту (код):** 1978 1210

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190538

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|--|-----|----------|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | слабка | 3 | |
| 3 | Листок: розмір | великий | 7 | |
| 4 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | сильна | 7 | |
| 5 | Листок: пухирчастість | слабка | 3 | |
| 6 | Листок: зубці | помірні | 5 | |
| 7 | Листок: форма поперечного перерізу | слабко увігнута | 2 | |
| 8 | Листок: форма верхівки | від вузькотрикутної до широкотрикутної | 4 | |
| 9 | Листок: вушка | великі | 7 | |
| 10 | Листок: крила | відсутні або дуже слабко виражені | 1 | |
| 11 | Листок: кут між найнижчими бічними жилками | прямий або близький до прямого | 2 | |
| 12 | Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин) | на рівні | 5 | |
| 13 | Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см) | помірне | 5 | |
| 14 | Час цвітіння | пізній | 7 | |
| 15 | Язичкові квітки: щільність розміщення | помірно щільно | 5 | |
| 16 | Язичкові квітки: за формою | широкоюяцеподібні | 3 | |
| 17 | Язичкові квітки: положення відносно кошика | плескате | 1 | |
| 18 | Язичкові квітки: за довжиною | середні | 5 | |
| 19 | Язичкові квітки: забарвлення | помірно жовте | 3 | |
| 20 | Трубчасті квітки: забарвлення | жовте | 1 | |
| 21 | Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки | відсутнє | 1 | |
| 22 | Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки | ознака не визначається | 0 | |
| 23 | Трубчасті квітки: продукування пилку | наявне | 9 | |
| 24 | Листки обгортки: за формою | чітко видовжені | 1 | |
| 25 | Листки обгортки: верхівка за довжиною | середня | 5 | |
| 26 | Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку | помірна | 5 | |
| 27 | Листки обгортки: положення відносно кошика | не охоплює або дуже злегка охоплює | 1 | |
| 28 | Рослина: за висотою | висока | 7 | |
| 29 | Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища) | відсутнє | 1 | |
| 30 | Рослина: тип галуження (як для 29) | ознака не визначається | 0 | |
| 31 | Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика | ознака не визначається | 0 | |
| 32 | Кошик: положення | обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом | 7 | |
| 33 | Кошик: розмір | великий | 7 | |
| 34 | Кошик: за формою з боку сім'янок | злегка випуклий | 4 | |
| 35 | Сім'янка: розмір | середній | 5 | |
| 36 | Сім'янка: форма | вузькоюяцеподібна | 2 | |
| 37 | Сім'янка: за товщиною відносно ширини | середня | 5 | |
| 38 | Сім'янка: основне забарвлення | чорне | 7 | |
| 39 | Сім'янка: смужки на краях | сильно виражені | 3 | |
| 40 | Сім'янка: смужки між краями | сильно виражені | 3 | |
| 41 | Сім'янка: забарвлення смужок | сіре | 2 | |
| 42 | Сім'янка: плямистість перикарпію | відсутня | 1 | |
| 43 | Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>) | наявна | 9 | |
| 44 | Стійкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.) | наявна | 9 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|------|---|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 21,7 | 24,8 | - |
| Довірчий інтервал (ц/га), ± | 0,6 | 0,7 | - |
| Урожайність, ц/га | 22,1 | 29,1 | - |
| ± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га | 0,4 | 4,3 | - |
| ± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, % | 1,8 | 17,3 | - |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 123 | 126 | - |
| Маса 1000 сім'янок, г | 52,0 | 63,8 | - |
| Висота рослин, см | 149 | 185 | - |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 9 | - |
| Стійкість проти білої гнилі, бал | 8 | 9 | - |
| Стійкість проти строї гнилі, бал | 9 | 8 | - |
| Стійкість до вовчка, бал | 8 | 9 | - |
| Стійкість до іржі, бал | 8 | 8 | - |
| Стійкість до фомозу, бал | 8 | 9 | - |
| Вміст олії, % | 47,8 | 48,8 | - |
| Вміст білка, % | 15,2 | 16,4 | - |
| Лушпинність, % | 29,7 | 32,0 | - |
| Напрямок використання: олійний | | | |
| Блок: середньостиглий | | | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.