

Заявка №: 09004439

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту: М 53 зс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.04.2010 Патент №: 10201

Дата пріоритету: 19.05.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.03.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10259

| №  | Ознака  | Проявлення                     | Код |
|----|---|--------------------------------|-----|
| 1  | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви  | помірне                        | 5   |
| 2  | Перший листок: форма верхівки   | округла                        | 3   |
| 3  | Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)                               | дуже великий (>75)             | 9   |
| 4  | Листок: положення листкової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)                             | поникле                        | 9   |
| 5  | Стебло: зигзагоподібність   | відсутня або дуже слабка       | 1   |
| 6  | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів  | слабке                         | 3   |
| 7  | Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)                                  | від дуже раннього до раннього  | 2   |
| 8  | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)                 | відсутнє або дуже слабке       | 1   |
| 9  | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі) | відсутнє або дуже слабке       | 1   |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)     | помірне                        | 5   |
| 11 | Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)  | середньої щільності            | 5   |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)                             | середній (26-50)               | 5   |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті   | ледь відхилене                 | 3   |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.   | мала від 5 до 15               | 3   |
| 15 | Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин)  | ранній                         | 3   |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення "шовку"  | наявне                         | 9   |
| 17 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"  | сильна                         | 7   |
| 18 | Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)   | відсутнє або дуже слабке       | 1   |
| 19 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см                              | коротка від 21 до 30           | 3   |
| 20 | Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)                | середня                        | 5   |
| 21 | Волоть: бічні гілочки за довжиною   | середні                        | 5   |
| 22 | Лише для самоzapильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см                                 | коротка від 101 до 125         | 3   |
| 23 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см           | ознака не визначається         | 0   |
| 24 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини                           | середнє                        | 5   |
| 25 | Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см                              | середня від 8.1 до 10.0        | 5   |
| 26 | Качан: ніжка за довжиною, см  | відсутня або дуже коротка до 5 | 1   |
| 27 | Качан: за довжиною (без обгортки), см   | середній (19-22)               | 5   |
| 28 | Качан: діаметр (посередені) см  | середній від 3,1 до 4,0        | 5   |
| 29 | Качан: форма  | циліндрична                    | 3   |
| 30 | Качан: кількість зернових рядів, шт.  | середня від 15 до 18           | 5   |
| 31 | Качан: тип зернини (в центральній третині качана)   | зубовий                        | 5   |
| 32 | Качан: колір верхівки зернини   | жовтий                         | 3   |
| 33 | Качан: колір низу зернини   | жовтувато-білий                | 2   |
| 34 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня  | відсутнє                       | 1   |
| 35 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня  | ознака не визначається         | 0   |