

Заявка №: 09004780

Вид: Кукурудза

Zea mays L

Назва сорту: АЦ 17 МВ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету: 22.12.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

16.04.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10398

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1 | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 2 | Перший листок: форма верхівки | загострена | 1 |
| 3 | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном) | малий (6-25) | 3 |
| 4 | Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном) | ледь похиле | 3 |
| 5 | Стебло: зигзагоподібність | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 6 | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 7 | Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин) | середній | 5 |
| 8 | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 9 | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на шойно з'явлених пиляках) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 11 | Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі) | нешільне | 3 |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті) | середній (26-50) | 5 |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті | ледь відхилене | 3 |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт. | середня від 15 до 26 | 5 |
| 15 | Качан: час появи "шовку" (у 50 % рослин) | середній | 5 |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення "шовку" | наявне | 9 |
| 17 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" | слабка | 3 |
| 18 | Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини) | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 19 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см | коротка від 21 до 30 | 3 |
| 20 | Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті) | середня | 5 |
| 21 | Волоть: бічні гілочки за довжиною | середні | 5 |
| 22 | Лише для самозапилюваних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см | довга від 151 до 200 | 7 |
| 23 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см | ознака не визначається | 0 |
| 24 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини | мале | 3 |
| 25 | Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см | середня від 8,1 до 10,0 | 5 |
| 26 | Качан: ніжка за довжиною, см | коротка від 5,1 до 10 | 3 |
| 27 | Качан: за довжиною (без обгортки), см | середній (19-22) | 5 |
| 28 | Качан: діаметр (посередені) см | середній від 3,1 до 4,0 | 5 |
| 29 | Качан: форма | циліндрична | 3 |
| 30 | Качан: кількість зернових рядів, шт. | середня від 15 до 18 | 5 |
| 31 | Качан: тип зернини (в центральній третині качана) | зубоподібний | 4 |
| 32 | Качан: колір верхівки зернини | жовтий | 3 |
| 33 | Качан: колір низу зернини | жовтий | 3 |
| 34 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня | наявне | 9 |
| 35 | Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня | помірна | 5 |