

Заявка №: 08009001

Вид: Рис

Oryza sativa L.

Назва сорту: Онтаріо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №: 10388

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.01.2010

Свідоцтво про державну реєстрацію № 10050

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1  | Колооптиль: колір   | безбарвний               | 1   |
| 2  | Основний листок: колір піхви  | зелений                  | 1   |
| 3  | Листок: за інтенсивністю зеленого кольору                           | помірний                 | 5   |
| 4  | Листок: антоціанове забарвлення                                     | відсутнє                 | 1   |
| 5  | Листок: поширення антоціанового забарвлення                         | ознака не визначається   | 0   |
| 6  | Листкова піхва: антоціанове забарвлення                             | відсутнє                 | 1   |
| 7  | Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення             | ознака не визначається   | 0   |
| 8  | Листок: опушеність поверхні пластинки                               | відсутня або дуже слабке | 1   |
| 9  | Листок: вушка   | наявні                   | 9   |
| 10 | Листок: антоціанове забарвлення вушок                               | відсутнє                 | 1   |
| 11 | Листок: шийка   | наявна                   | 9   |
| 12 | Листок: антоціанове забарвлення шийки                               | відсутнє                 | 1   |
| 13 | Листок: язичок  | наявний                  | 9   |
| 14 | Листок: форма язичка  | подвійний                | 3   |
| 15 | Листок: колір язичка  | безбарвний               | 1   |
| 16 | Листок: за довжиною листкової пластинки                             | середній                 | 5   |
| 17 | Листок: за шириною пластинки  | середній                 | 5   |
| 18 | Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)          | пряме                    | 1   |
| 19 | Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)          | пряме                    | 1   |
| 20 | Стебло: здатність утворювати коліно (тільки для плавательного рису) | відсутня                 | 1   |
| 21 | Рослина: положення стебел   | пряме                    | 1   |
| 22 | Час викидання волоті (50% рослин з волотями)                        | середній                 | 5   |
| 23 | Чоловіча стерильність   | відсутня                 | 1   |
| 24 | Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля                  | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 25 | Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою    | відсутнє або дуже слабе  | 1   |
| 26 | Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки              | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 27 | Колосок: забарвлення приймочки                                      | біле                     | 1   |
| 28 | Стебло: за товщиною   | середнє                  | 5   |
| 29 | Стебло: за довжиною (включно волоть; плавательний рис у тому числі) | середнє                  | 5   |
| 30 | Стебло: антоціанове забарвлення вузлів                              | відсутнє                 | 1   |
| 31 | Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузла               | ознака не визначається   | 0   |
| 32 | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів                           | відсутнє                 | 1   |
| 33 | Волоть: довжина головної осі  | середня                  | 5   |
| 34 | Волоть: вигин головної осі  | пряма                    | 1   |
| 35 | Волоть: кількість на рослині  | середня кількість        | 5   |
| 36 | Волоть: остюки  | відсутні                 | 1   |
| 37 | Волоть: колір остюків (раннє обстеження)                            | ознака не визначається   | 0   |
| 38 | Волоть: розташування остюків  | ознака не визначається   | 0   |
| 39 | Волоть: колір остюків (пізнє обстеження)                            | ознака не визначається   | 0   |
| 40 | Колосок: густина опушення нижньої квіткової луски                   | слабке                   | 3   |
| 41 | Колосок: колір верхівки нижньої квіткової луски                     | білий                    | 1   |
| 42 | Волоть: довжина найдовших остюків                                   | ознака не визначається   | 0   |
| 43 | Волоть: наявність вторинного гілкування                             | відсутнє                 | 1   |
| 44 | Волоть: тип вторинного гілкування                                   | ознака не визначається   | 0   |

|    |  |                        |   |
|----|--|------------------------|---|
| 45 | Волоть: положення гілок  | пряма                  | 1 |
| 46 | Волоть: прояв  | добре проявляється     | 9 |
| 47 | Час достигання   | середній               | 5 |
| 48 | Листок: пожовтіння (старіння)  | середнє                | 5 |
| 49 | Стерильна нижня колоскова луска: за довжиною   | коротка                | 3 |
| 50 | Стерильна нижня луска: за кольором   | солом'яний             | 1 |
| 51 | Зернівка: маса 1000 розвинених зерен   | середня                | 5 |
| 52 | Зернівка: за довжиною  | середня                | 5 |
| 53 | Зернівка: за шириною   | середня                | 5 |
| 54 | Зернівка: реакція нижньої квіткової луски на фенол                                     | відсутня               | 1 |
| 55 | Лише сорти з реакцією нижньої квіткової луски на фенол: Зернівка: забарвлення у фенолі | ознака не визначається | 0 |
| 56 | Обрушена зернівка: за довжиною   | середня                | 5 |
| 57 | Обрушена зернівка: за шириною  | середня                | 5 |
| 58 | Обрушена зернівка: за формою (вигляд збоку)  | напівкругла            | 2 |
| 59 | Обрушена зернівка: за кольором   | біла                   | 1 |
| 60 | Ендосперм: за присутністю амілази  | неглютинозний          | 3 |
| 61 | Ендосперм: вміст амілази   | від 11 до 15 %         | 3 |
| 62 | Лише сорти з ендоспермом без амілаз: Полірована зернівка: прояв білого ядра            | ознака не визначається | 0 |
| 63 | Лише сорти з ендоспермом без амілази: Полірована зернівка: прояв білого черевця        | ознака не визначається | 0 |
| 64 | Лужна дигестія   | слабко дигестує        | 3 |
| 65 | Обрушена зернівка: аромат  | відсутній              | 1 |