

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Заявка №: 08075007

Вид: Горіх грецький

Juglans regia L.

Назва сорту: Скиносский

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.01.2009

Свідоцтво про державну реєстрацію № 09192

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|---|-----|
| 1 | Дерево: за силою росту | середньої сили | 5 |
| 2 | Дерево: габітус | прямий | 3 |
| 3 | Дерево: щільність розміщення гілок | середня щільність | 5 |
| 4 | Дерево: розміщення генеративних бруньок | на верхівці річного пагона (плодоношення по периферії дерева) | 1 |
| 5 | Річний пагін: за кольором | світло-коричневий | 2 |
| 6 | Листок: форма бічних листочків | еліптична | 5 |
| 7 | Квітка: кількість чоловічих суцвіть | середня кількість | 5 |
| 8 | Горіх: за розміром | середній | 5 |
| 9 | Горіх: форма у повздовжньому перерізі через шов | яйцевидна | 4 |
| 10 | Горіх: форма у повздовжньому перерізі перпендикулярно до шва | широко-яйцевидна | 3 |
| 11 | Горіх: форма у поперечному перерізі | округла | 2 |
| 12 | Горіх коефіцієнт округлості | середній | 5 |
| 13 | Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва) | клиновидна | 3 |
| 14 | Горіх: форма верхівки (як для 13) | округла | 2 |
| 15 | Горіх: помітність апікального кінчика | помірна | 5 |
| 16 | Горіх: положення "сідельця" на шві | за всією довжиною | 3 |
| 17 | Горіх: помітність сідельця на шві | помірна | 5 |
| 18 | Горіх: ширина "сідельця" на шві | помірне | 5 |
| 19 | Горіх: глибина борізки вздовж "сідельця" на шві | глибока | 3 |
| 20 | Горіх: структура поверхні шкаралупи | помірно боріздчаста | 2 |
| 21 | Горіх: товщина шкаралупи | середня | 5 |
| 22 | Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи | помірна | 5 |
| 23 | Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок | середні | 5 |
| 24 | Ядро: легкість видалення зі шкаралупи | дуже легке | 1 |
| 25 | Ядро: за інтенсивністю основного кольору | дуже світле | 1 |
| 26 | Ядро: за розміром | середнє | 5 |
| 27 | Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха | середнє | 5 |
| 28 | Час досягання | ранній | 3 |
| 29 | Час листопаду | ранній | 3 |
| 30 | Листок: здатність до обпадання | не обпадає | 1 |
| 31 | Оплодень: здатність до обпадання | частково обпадає | 2 |
| 32 | Час розпукування вегетативних бруньок | між раннім і середнім | 4 |
| 33 | Час цвітіння чоловічих квіток | між середнім і пізнім | 6 |
| 34 | Час цвітіння жіночих квіток | дуже ранній | 1 |
| 35 | Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими | пізніше (протогенічний) | 3 |