

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata***Заявка № 2026421005 Назва сорту:** Гіральда**Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840 Підтримувач сорту (код): 840****Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 27.05.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію № 260340****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	сильний	3	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	дуже сильне	9	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	великий	7	
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	округла	3	
14	Листок: за товщиною	товстий	7	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглістю	напівпряме	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	округла	4	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявні	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	дуже мілка	1	
30	Листок: щільність надрізаності краю	нещільна	3	
31	Листок: за типом надрізаності	неправильно зубчастий	3	
32	Листкова пластинка: жилкування	напіввіялоподібне	3	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку стрілкування	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час квітування)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси – <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиць – <i>Nasonovia ribis nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0	відсутня	1	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу – <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	наявна	9	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	плаский	3	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	мілка	3	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 31. Середня маса головки, г – 330. Щільність головки, бал (1–9) – 7. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, днів – 60. Група стиглості: 5 – середня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5,3; цукрів, % – 2,4; вітаміну С, мг % – 16. Холодостійкість, бал (1–9) – 5. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhunuz) – 9, чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 6, септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 5, вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 2.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3г.