

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 2025110011 Назва сорту:** Вісконсін СМР 58

**Заявник (код): 1163 Підтримувач сорту (код): 1163**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 05.06.2026

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 260355**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака                                                                                                         | Проявлення             | Код | Примітка      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------|
| 1  | Сім'ядолі: гіркота                                                                                             | наявна                 | 9   |               |
| 2  | Рослина: тип росту                                                                                             | індетермінантний       | 2   |               |
| 3  | Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів                                                                  | середня                | 5   |               |
| 4  | Листкова пластинка: положення                                                                                  | горизонтальне          | 2   |               |
| 5  | Листкова пластинка: за довжиною                                                                                | середня                | 5   |               |
| 6  | Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки                                   | мале                   | 3   |               |
| 7  | Листкова пластинка: форма апікальної лопаті                                                                    | гостра                 | 1   |               |
| 8  | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення                                                         | сильна                 | 7   |               |
| 9  | Листкова пластинка: пухирчатість                                                                               | слабка                 | 3   |               |
| 10 | Листок: хвилястість краю                                                                                       | помірна                | 2   |               |
| 11 | Листкова пластинка: зубчастість краю                                                                           | помірна                | 5   |               |
| 12 | Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)                                   | середній               | 5   |               |
| 13 | Рослина: виявлення статі                                                                                       | моноеційність          | 1   |               |
| 14 | Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі                                                                     | переважно 1 або 2      | 2   |               |
| 15 | Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву                                                                       | біле                   | 1   |               |
| 16 | Партенокарпія                                                                                                  | відсутня               | 1   |               |
| 17 | Плід: за довжиною                                                                                              | короткий               | 3   | до середнього |
| 18 | Плід: діаметр                                                                                                  | середній               | 5   |               |
| 19 | Плід: відношення довжина / діаметр                                                                             | середнє                | 5   |               |
| 20 | Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду                                                          | середнє                | 5   |               |
| 21 | Плід: форма поперечного перерізу                                                                               | округла                | 1   |               |
| 22 | Плід: форма основи                                                                                             | тупа                   | 3   |               |
| 23 | Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною                                                             | ознака не визначається | 0   |               |
| 24 | Плід: форма верхівки                                                                                           | округла                | 3   |               |
| 25 | Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості                                                    | зелене                 | 3   |               |
| 26 | За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)                   | слабка                 | 3   |               |
| 27 | Плід: ребристість                                                                                              | відсутня або слабка    | 1   |               |
| 28 | Плід: борозенки                                                                                                | наявні                 | 9   |               |
| 29 | Плід: зморшкуватість                                                                                           | наявна                 | 9   |               |
| 30 | Плід: ступінь зморшкуватості                                                                                   | слабкий                | 3   |               |
| 31 | Плід: тип покриву                                                                                              | волоски і шипики       | 2   |               |
| 32 | Плід: покрив за щільністю                                                                                      | нещільний              | 3   |               |
| 33 | Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву                                   | біле                   | 1   |               |
| 34 | Плід: горбочки                                                                                                 | наявні                 | 9   |               |
| 35 | Плід: розмір горбочків                                                                                         | малий                  | 3   |               |
| 36 | Плід: смужки за довжиною                                                                                       | довгі                  | 7   |               |
| 37 | Плід: плями                                                                                                    | наявні                 | 9   |               |
| 38 | Плід: характер поширення плям                                                                                  | переважно смугами      | 2   |               |
| 39 | Плід: довжина плям відносно довжини плоду                                                                      | по всій довжині        | 5   |               |
| 40 | Плід: щільність плям                                                                                           | щільна                 | 7   |               |
| 41 | Плід: наліт                                                                                                    | сильний                | 7   |               |
| 42 | Плід: плодоніжка за довжиною                                                                                   | середня                | 5   |               |
| 43 | Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості                                                | коричнєве              | 5   |               |
| 44 | Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)                                                          | відсутня               | 1   |               |
| 45 | Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))                                  | помірно стійкий        | 2   |               |
| 46 | Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )                                                | помірно стійкий        | 2   |               |
| 47 | Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )                            | помірно стійкий        | 2   |               |
| 48 | Стійкість проти буроті плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )                                              | відсутня               | 1   |               |
| 49 | Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)                                                          | відсутня               | 1   |               |
| 50 | Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> ) (CGMMV) | наявна                 | 9   |               |

**За інформацією, наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 125,0. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,8. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 55. Тривалість періоду плодоношення, діб – 61. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріозу – 5, *Cucumber mosaic cucumivirus* (CMV) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** зах. ґрунт.