

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina***Заявка № 2026120003 Назва сорту:** Ексмокс**Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 04.06.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260352**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	роздільний	2	
7	Рослина: діаметр	малий	3	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	відсутній або слабкий	1	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	тонкий	3	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглості	напівпряме	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	ознака не визначається	0	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	ознака не визначається	0	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	дуже сильна	9	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
26	Листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
27	Листок: хвилястість краю	слабка	3	до помірної
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявна	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	середня	5	до глибокої
30	Листок: щільність надрізаності краю	помірна	5	
31	Листок: за типом надрізаності	тризубчастий	5	
32	Листок: жилкування	напіввіялоподібне	3	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабе	1	
34	Час збиральної стиглості	ознака не визначалась	0	
35	Час початку стрілкування	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час квітування)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування)	дуже слабка	1	до слабкої
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси – <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць – <i>Nasonovia ribis nigris</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу – <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	відсутня	1	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	середня	5	
45	Листок: кількість розчленувань	велика	7	до дуже великої
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	дуже мала	1	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	мілька	3	до середньої
50	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 41,2. Тривалість періоду до досягання, діб – 50,0. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): несправжньої борошнистої роси – 9, борошнистої роси – 8, білої гнилі – 8, септоріозу – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.