

Вид: Слива домашня *Prunus domestica* L.**Заявка № 2026261002 Назва сорту:** ТОПФЬОРСТ**Заявник (код):** 3368 **Підтримувач сорту (код):** 3368**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.06.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260358**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	середня	5	
2	Дерево: щільність крони	помірна	5	
3	Однорічний пагін: положення	напівпряме	3	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	слабке	3	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	середній	5	
9	Однорічний пагін: форма вегетативної бруньки	загострена	1	
10	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	злегка відхилене	2	
11	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	середній	5	
12	Однорічний пагін: опора підбрунькового виступу	наявна	9	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (впродовж інтенсивного росту)	слабке	3	
14	Листкова пластинка: положення по відношенню до пагона	спрямоване назовні	2	
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
16	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
17	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
18	Листкова пластинка: форма	яйцеподібна	1	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за виключенням кінчика)	гострий	1	
20	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
21	Листкова пластинка: зелене забарвлення верхнього боку	помірне	5	
22	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
23	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
24	Листкова пластинка: форма краю	пилчаста	2	
25	Черешок: за довжиною	середній	5	
26	Черешок: опушення нижнього боку	слабке	3	
27	Листок: відношення довжини листової пластинки до довжини черешка	середнє	5	
28	Листок: нектарники	наявні	9	
29	Листок: розміщення нектарників	переважно на черешку	3	
30	Квітучий пагін: кількість квіток	велика	7	
31	Квітка: діаметр (повністю відкриті квітки)	середній	5	
32	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
33	Квітконіжка: опушення	відсутнє	1	
34	Чашечка: положення чашолистків	не торкаються ні пелюсток, ні квітколожа	2	
35	Чашолисток: форма	еліптична	2	
36	Квітка: розташування пелюсток	дотичне	2	
37	Пелюстка: розмір	середній	5	
38	Пелюстка: форма	округла	3	
39	Пелюстка: хвилястість краю	відсутня	1	
40	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	вище	3	
41	Пиляк: забарвлення (перед розтріскуванням)	жовтувате	1	
42	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
43	Плід: розмір	середній	5	
44	Плід: форма (вигляд збоку)	яйцеподібна	5	
45	Плід: симетричність (вигляд збоку)	несиметричний	2	
46	Плід: шов у напрямку до кінця плодоніжки за глибиною	середній	5	
47	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або слабке	1	
48	Плід: опушення верхівки	відсутнє	1	
49	Плід: заглиблення плодоніжки	середнє	5	
50	Плід: основне забарвлення шкірочки (після видалення воскового нальоту)	фіолетово-синє	10	
51	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	4	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: соковитість	висока	7	
54	Плід: ступінь зростання кісточки з м'якоттю	не зрощені	1	
55	Кісточка: основна форма (вигляд збоку)	еліптична	2	
56	Кісточка: форма з черевного боку	еліптична	2	
57	Кісточка: розвиток кіля	середній	5	
58	Кісточка: структура бічної поверхні	карбована	2	
59	Кісточка: основа за шириною	середня	5	
60	Кісточка: форма верхівки	тупа	2	
61	Час початку цвітіння	ранній	3	
62	Час початку достигання плодів	ранній	3	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: рання – 3. Урожайність, т/га – 18,0. Середній урожай з дерева, кг – 35,0. Середня маса плоду, г – 40,0; кісточка – 1,6. Відокремлення кісточка від м'якоті: відокремлюється – 3. Вміст в пло-

дах загального цукру, % – 10,0; аскорбінової кислоти, мг/100 г – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): моніліоз (*Monilia cinerea* Bopord.) – 6, червона плямистість (полістігмоз) (*Polystigmia rubra* Sacc.) – 7, іржа (*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): сливова плодожерка (*Laspeyresia* (*Grapholifha*) *fune-brana* Tr.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.