

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 2026096003 Назва сорту: Фостер

Заявник (код): 2752 Власник сорту (код): 2752

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.08.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260444

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2.1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3	
2.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2.3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5.1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5.2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5.3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	сильний	3	
8.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9.1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9.2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно-вузькоеліптична	1	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	великий	7	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	середня	5	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33.1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	середній	5	
33.2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33.3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5	
35	Чоловіча стерильність	відсутня	1	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 70,0. Період від сівби до початку досягання, діб – 100. Лежкість, балів (1–9) – 5. Вміст вітаміну С, мг % – 70,0; загального цукру, % – 3,0; сухої речовини, % – 7,0. Стійкість проти хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизистий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: зах. ґрунт.