

**Вид:** Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка №** 2026115001 **Назва сорту:** Пінк Найс**Заявник (код):** 2710 **Власник сорту (код):** 2710**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.08.2026**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 260445**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака                                                                                                       | Проявлення                   | Код | Примітка |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 1  | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія                                                                | наявне                       | 9   |          |
| 2  | Рослина: тип розвитку                                                                                        | індетермінантний             | 2   |          |
| 3  | Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)          | ознака не визначається       | 0   |          |
| 4  | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині                                                            | помірне                      | 5   |          |
| 5  | Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям                                 | середнє                      | 5   |          |
| 6  | Листок: положення (у середній третині рослини)                                                               | напівпоникле                 | 7   |          |
| 7  | Листок: за довжиною                                                                                          | середній                     | 5   |          |
| 8  | Листок: за шириною                                                                                           | середній                     | 5   |          |
| 9  | Листок: за розсіченістю                                                                                      | двічі перистий               | 2   |          |
| 10 | Листок: розмір листочків (у середній частині листка)                                                         | середній                     | 5   |          |
| 11 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                                                                   | помірна                      | 5   |          |
| 12 | Листок: глянуватість (як для 6)                                                                              | помірна                      | 5   |          |
| 13 | Листок: пухирчастість (як для 6)                                                                             | помірна                      | 5   |          |
| 14 | Листок: розмір пухирів (як для 6)                                                                            | середній                     | 5   |          |
| 15 | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі                                                    | похиле                       | 7   |          |
| 16 | Суцвіття: за типом                                                                                           | переважно галузисте          | 3   |          |
| 17 | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)                                                                    | відсутня                     | 1   |          |
| 18 | Квітка: опушення приймочки маточки                                                                           | відсутнє або дуже слабке     | 1   |          |
| 19 | Квітка: забарвлення                                                                                          | жовте                        | 1   |          |
| 20 | Квітконіжка: відокремлюючий шар                                                                              | наявний                      | 9   |          |
| 21 | Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки) | середня                      | 5   |          |
| 22 | Плід: розмір                                                                                                 | середній                     | 5   |          |
| 23 | Плід: відношення довжини до діаметра                                                                         | велике                       | 7   |          |
| 24 | Плід: форма поздовжнього розрізу                                                                             | кугаста (видовжена)          | 4   |          |
| 25 | Плід: ребристість біля плодоніжки                                                                            | слабка                       | 3   |          |
| 26 | Плід: форма поперечного перерізу                                                                             | кругласта                    | 2   |          |
| 27 | Плід: заглиблення біля плодоніжки                                                                            | помірне                      | 5   |          |
| 28 | Плід: розмір рубця плодоніжки                                                                                | середній                     | 5   |          |
| 29 | Плід: розмір квіткового рубця                                                                                | малий                        | 3   |          |
| 30 | Плід: форма кінця плоду                                                                                      | від заглибленої до плескатої | 2   |          |
| 31 | Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі                                                               | середній                     | 5   |          |
| 32 | Плід: перикарпій за товщиною                                                                                 | середній                     | 5   |          |
| 33 | Плід: кількість насіннєвих камер                                                                             | три-чотири                   | 3   |          |
| 34 | Плід: зелене плече (перед досяганням)                                                                        | відсутнє                     | 1   |          |
| 35 | Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)                                                               | ознака не визначається       | 0   |          |
| 36 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)                                            | ознака не визначається       | 0   |          |
| 37 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)                              | помірна                      | 5   |          |
| 38 | Плід: забарвлення (за досягання)                                                                             | рожеве                       | 4   |          |
| 39 | Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)                                                                     | рожеве                       | 4   |          |
| 40 | Плід: за твердістю                                                                                           | помірний                     | 5   |          |
| 41 | Плід: термін лежкості                                                                                        | помірний                     | 5   |          |
| 42 | Час цвітіння                                                                                                 | середній                     | 5   |          |
| 43 | Час досягання                                                                                                | середній                     | 5   |          |
| 44 | Плід: вміст сухої речовини (за досягання)                                                                    | середній                     | 5   |          |
| 45 | Чутливість до сріблястості                                                                                   | несприятливий                | 1   |          |
| 46 | Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>                                                                 | наявна                       | 9   |          |
| 47 | Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>                                                                  | відсутня                     | 1   |          |
| 48 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>                                          | наявна                       | 9   |          |
| 49 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>                                  | наявна                       | 9   |          |
| 50 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )                                           | наявна                       | 9   |          |
| 51 | Стійкість проти Tomato Mosaic Virus                                                                          | наявна                       | 9   |          |
| 52 | Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>                                                                | відсутня                     | 1   |          |
| 53 | Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>                                                              | наявна                       | 9   |          |
| 54 | Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.                                                                      | наявна                       | 9   |          |
| 55 | Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>                                                | наявна                       | 9   |          |
| 56 | Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>                                                                | наявна                       | 9   |          |
| 57 | Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus                                                                | відсутня                     | 1   |          |
| 58 | Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus                                                                    | наявна                       | 9   |          |
| 59 | Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>                                                                    | відсутня                     | 1   |          |
| 60 | Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>                                                                   | наявна                       | 9   |          |
| 61 | Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)                                                                  | наявна                       | 9   |          |
| 62 | Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою                                                              | низька                       | 3   |          |
| 63 | Плід: зелені смуги (перед досяганням)                                                                        | відсутні                     | 1   |          |
| 64 | Плід: глянуватість шкірки                                                                                    | помірна                      | 2   |          |
| 65 | Плід: епідерміс                                                                                              | знебарвлений                 | 1   |          |

**За інформацією, наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 98,0. Вміст каротину, мг % – 6,0; сухої речовини в плоді, % – 12,0; вітаміну С, мг % – 20,0; загального цукру, % – 14,0. Загальна кислотність, % – 0,2. Маса товарного плоду, г – 200,0. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 100. Тривалість періоду плодоношення, діб – 75. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофторозу (*Phytophthora infestans*) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** зах. ґрунт.