

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.**Заявка №** 2026045003 **Назва сорту:** Ацолія**Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 27.03.2026**Свідectво про державну реєстрацію №** 260228**Орган, що провів випробовування:** Bundesamt für Ernährungssicherheit, AT**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	від помірної до сильної	6	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	від середнього до великого	6	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	від помірної до сильної	6	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
13	Насінина: розмір	від середнього до великого	6	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	дуже ранній	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показники	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4,9
2	Тривалість періоду вегетації, діб	108
3	Стійкість проти вилягання, бал (1–9)	8
4	Стійкість проти обсіпання, бал (1–9)	8
5	Стійкість проти посухи, бал (1–9)	7
6	Висота прикріплення нижнього бобу, см	13
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз	7
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): переноспороз	7
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): септоріоз	7
10	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бобова вогнівка	8
11	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	21,5
12	Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	42,7
13	Напрямок використання	кормовий та харчовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.