

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка № 24040039 Назва сорту:** Трісід**Заявник (код):** 1626 2712 **Власник сорту (код):** 1626 2712 **Володілець патенту (код):** 1626 2712**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 07.09.2026 **Патент №** 260283**Дата пріоритету:** 07.06.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 09.09.2026**Свідчення про державну реєстрацію №** 260468**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака                                                          | Проявлення             | Код | Примітка |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|
| 1  | Насіння: вміст ерукової кислоти                                 | високий                | 9   |          |
| 2  | Сім'ядоля: за довжиною                                          | середня                | 5   |          |
| 3  | Сім'ядоля: за шириною                                           | середня                | 5   |          |
| 4  | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                      | помірна                | 5   |          |
| 5  | Листок: частки                                                  | наявні                 | 9   |          |
| 6  | Листок: кількість часток                                        | середня                | 5   |          |
| 7  | Листок: зубчастість краю                                        | помірна                | 5   |          |
| 8  | Листок: за довжиною (пластинка і черешок)                       | середній               | 5   |          |
| 9  | Листок: за шириною (у найширшому місці)                         | вузький                | 3   |          |
| 10 | Лише сорти з часточковими листками. Листок: черешок за довжиною | середній               | 5   |          |
| 11 | Рослина: час початку цвітіння                                   | середній               | 5   |          |
| 12 | Квітка: забарвлення пелюсток                                    | жовте                  | 3   |          |
| 13 | Квітка: пелюстки за довжиною                                    | середні                | 5   |          |
| 14 | Квітка: пелюстки за шириною                                     | середні                | 5   |          |
| 15 | Рослина: утворення пилку                                        | наявне                 | 9   |          |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння)                       | низька                 | 3   |          |
| 17 | Рослина: за довжиною                                            | коротка                | 3   |          |
| 18 | Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)               | довгий                 | 7   |          |
| 19 | Стручок: носик за довжиною                                      | довгий                 | 7   |          |
| 20 | Стручок: плодоніжка за довжиною                                 | довга                  | 7   |          |
| 21 | Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби            | дуже сильна            | 9   |          |
| 22 | Тенденція до формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби      | ознака не визначається | 0   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник                                            | Значення |       |       |
|-----------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                                     | С        | Л     | П     |
| Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га    | 1,27     | 2,48  | 2,07  |
| Тривалість періоду вегетації, діб                   | 289      | 297   | 300   |
| Висота рослини, см                                  | 107,3    | 109,4 | 102,6 |
| Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г | 4,2      | 4,7   | 5,2   |
| Вміст білка, %                                      | 23,5     | 21,6  | 21,7  |
| Вміст олії, %                                       | 44       | 45,8  | 45,3  |
| Вміст ерукової кислоти, %                           | 44       | 42,8  | 43,9  |
| Вміст глюкозинолатів, %                             | 1,4      | 1,4   | 1,2   |
| Стійкість проти вилягання, бал                      | 8        | 9     | 9     |
| Стійкість проти обсіпання, бал                      | 5        | 7     | 7     |
| Стійкість проти посухи, бал                         | 6        | 7     | 7     |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал                  | 8        | 4     | 5     |
| Стійкість проти пильщика ріпакового, бал            | 7        | 8     | 5     |
| Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал           | 7        | 5     | 4     |
| Стійкість проти бактеріозу, бал                     | 9        | 9     | 9     |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал                  | 9        | 7     | 7     |
| Блок                                                | 5        | 5     | 5     |
| Напрямок використання                               | техн.    | техн. | техн. |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.