

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 2025155002 Назва сорту: Трігрін

Заявник (код): 1626 Власник сорту (код): 1626 Володілець патенту (код): 1626 Підтримувач сорту (код): 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.09.2026 Патент № 260293

Дата пріоритету: 07.11.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.09.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260473

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
4	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
5	Рослина: за природною висотою без яровизації	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення без яровизації	сильна	7	
7	Рослина: габітус	проміжний	5	
8	Рослина: схильність до цвітіння без яровизації	помірна	5	
9	Рослина: за природною висотою після яровизації	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення після яровизації	сильна	7	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	товсте	7	
14	Стебло: кількість міжвузлів	велика	7	
15	Стебло: опушення за щільністю	помірне	5	
16	Листок: форма центрального листочка	овальна	2	
17	Центральний листочок: за довжиною	середній	5	
18	Центральний листочок за шириною	широкий	7	
19	Листок: прояв малюнка	помірний	5	
20	Рослина: за природною висотою за другого укосу	висока	7	
21	Черешок: опушення за щільністю	від нещільного до помірного	4	
22	Листок: прояв малюнка	помірний	5	
23	Листок: черешок за довжиною	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,35. Збір сухої речовини, т/га – 14,3. Вміст у сухій речовині, %: білка – 23,1; клітковини – 21,5. Тривалість періоду від весняного відростання до укісної стиглості, діб – 90. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 112. Кількість укосів, шт. – 2. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 2,9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Облистяність, % – 45,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *trifolii* Rbnh.) – 3, іржа (*Uromyces fallens* Kern.) – 5, антракноз (*Kabatiella caulivora* Kat.) – 6, аскохітоз (*Ascochyta trifolii* Bond. et Trus.) – 6, бура плямистість (*Pseudopeziza trifolii* (Biv.-Bern.) Fuck.) – 4, бактеріоз (*Phytophthora trifoliorum* (L. R. Jones) Burkh.; *Pseudomonas trifoliorum* Stapp) – 8, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* Schl. f. *trifolii* Railllo) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): люцернова товстонижка – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.